

7. ANTHODILETA COLLARIS (V.).

Nom indigène : *Toorourou*.

Mâle tué à Toumouli. Yeux, bec et pattes noirs.

LISTE DES MAMMIFÈRES

RECUEILLIS PAR M. ÉDOUARD FOA DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS,

PAR M. E. DE POUSARGUES.

Les collections dont M. E. Foa annonçait l'envoi dans une lettre datée de Tête (Haut Zambèze), janvier 1897⁽¹⁾, sont arrivées en bon état au Muséum vers la fin du mois de mai; ces collections contenaient soixante-six dépouilles de Mammifères, qui se répartissent entre trente-six espèces, dont voici la liste :

1. CERCOPITHECUS ALBIGULARIS (Syk.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Nchima*.

2. CERCOPITHECUS RUFOVIRIDIS (I. Geoff.), 2 ♂ et ♀. — Nom indigène : *Poussi*.

3. PAPIO CYNOCEPHALUS (E. Geoff.), ♂. — Nom indigène : *Coro* ou *Niani*.

Ce spécimen, d'une taille gigantesque, mesure 1 mètre de longueur pour la tête et le corps, et 0 m. 75 pour la queue. Les teintes pâles du pelage présentent de grandes analogies avec celles du *P. pruinosus*, récemment décrit par M. O. Thomas⁽²⁾.

4. GALALO (*OTOLEMUR*) CRASSICAUDATUS (E. Geoff.), ♂, ♀ et jeune. — Nom indigène : *Tchanga*.

5. EPOMOPHORUS CRYPTURUS (Pet.), ♂. — Nom indigène : *Mlémi*.

Le Muséum ne possédait encore aucun représentant de cette espèce.

6. RHYNCHOCYON CIRNEI (Pet.), 2 ♂, 1 ♀, — Nom indigène : *Zolo* ou *Mboala*.

Ces trois exemplaires, en bon état, remplaceront avantageusement dans nos galeries l'unique spécimen un peu défectueux que M. Foa nous avait déjà rapporté de son premier voyage.

7. PETRODOMUS TETRADACTYLUS (Pet.), ♂. — Nom indigène : *Zolo*.

8. MACROSCELIDES INTUFI (A. Sm.), 1 ♂, 2 ♀ et un jeune. — Nom indigène : *Doundou*.

(1) Voir le *Bulletin du Muséum*, p. 78, n° 3, 1897.

(2) O. Thomas. P. Z. S., London, p. 789, 1896.

9. FELIS SERVAL (Schreb.), ♂. — Nom indigène : *Ndjouzi*.
10. FELIS CALIGATA (Tem.), ♀. — Nom indigène : *Bonga*.
11. GENETTA FELINA (Thunb.), ♀. — Nom indigène : *Mariri*.
12. HERPESTES CAFFER (Gm.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Nienga*.
13. HELOGALE UNDULATA (Pet.), ♀. — Nom indigène : *Ndounkounia*.
14. CROSSARCHUS FASCIATUS (Desm.), ♂. — Nom indigène : *Soulou*.
15. SCIURUS MUTABILIS (Pet.), ♂ et jeune. — Nom indigène : *Gourou* ou *Tchaomboua*.
16. SCIURUS CEPAPI (A. Sm.), ♂. — Nom indigène : *Sindé*.
17. ELIOMYS MURINUS (Desm.), ♂ et jeune. — Nom indigène : *Kadiamlamo*.
18. GERBILLUS TENUIS (A. Sm.), ♀. — Nom indigène : *Pagna* ou *Rongondo*.
19. STEATOMYS PRATENSIS (Pet.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Nsana*.
Cette intéressante espèce ne figurait pas encore dans nos collections.
20. MUS (ARVICANTHIS) DORSALIS (A. Sm.), 2 ♂, 2 ♀. — Nom indigène : *Péra*.
21. MUS (NANNOMYS) MINUTOIDES (A. Sm.), ♂. — Nom indigène : *Tsoukochenzi*.
22. SACCOSTOMUS CAMPESTRIS (Pet.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Msouko*.
23. AULACODUS CALAMOPHAGUS (de Beerst.), ♂ et jeune. — Nom indigène : *Tchenzi*.

Cette nouvelle espèce ne diffère peut-être pas de celle que Peters avait rencontrée sur les bords du Zambèze et qu'il avait d'abord distinguée dans ses manuscrits sous le nom d'*A. variegatus*⁽¹⁾; les dimensions sont sensiblement égales, et les soies mouillées présentent les mêmes reflets métalliques et irisés. De retour en Europe, le célèbre zoologiste allemand revint sur sa première détermination, et identifia sa nouvelle espèce avec l'*A. swindereianus* (Tem.), mais malheureusement sans fournir d'indications sur la forme et les dimensions du crâne des spécimens qu'il avait recueillis. La tête osseuse de l'*A. calamophagus* présente, comme je l'ai dit⁽²⁾, une hauteur et une largeur considérables, et, par sa forme et ses proportions, diffère notablement de tous les crânes d'*A. swindereianus* de l'Ouest africain auxquels j'ai pu la comparer; à plus forte raison, ce nouveau type est-il distinct des espèces *A. gregorianus*⁽³⁾ et *A. Sclateri*⁽⁴⁾ créées dernièrement

(1) Peters. *Reiso. n. Mossambique*, p. 138, 1852.

(2) *Bull. du Muséum*, p. 160, n° 5, 1897.

(3) O. Thomas. *Ann. Mag. natur. hist.* Ser. 6. Vol. XIII, p. 302, 1894.

(4) O. Thomas. *Zool. Anz.*, p. 190, n° 532, 31 mai 1897.

par M. O. Thomas, et dont les têtes sont plus faibles encore que celle de l'Aulacode de Swinderen.

24. *LEPUS OCHROPUS* (Wagn.), ♂ et 2 jeunes. — Nom indigène : *Kaloulou*.

25. *DENDROHYRAX ARBOREUS* (A. Sm.), ♀. — Nom indigène : *Moembéré*.

26. *PROCAVIA BRUCEI* (Gr.), ♂. — Nom indigène : *Bira*.

27. *EQUUS BURCHELLI*, VAR. *CRAWSHAYI* (Wint.), ♂. — Nom indigène : *Mbidzi*.

Ce spécimen que je n'avais pu déterminer qu'avec doute, d'après la courte diagnose préliminaire publiée par M. de Winton⁽¹⁾, répond exactement à la description plus complète que M. Pocock⁽²⁾ a donnée récemment de cette nouvelle variété du Daou.

28. *BUBALIS LICHTENSTEINI* (Pet.), ♂, ♀ et jeune. — Nom indigène : *Gondo*.

29. *CEPHALOPHUS GRIMMI* (L.), ♀. — Nom indigène : *Nyassa-Insa*.

30. *NESOTRAGUS MOSCHATUS* (v. Düb.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Kadoumba* ou *Roumza*.

31. *CERVICAPRA ARUNDINUM* (Bodd.), 2 ♂ et 2 ♀. — *Mpoio*.

32. *ÆPYCEROS MELAMPUS* VAR. *JOHNSTONI* (Thos.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Nsouala* ou *Palla*.

Cette variété à courtes cornes ne figurait pas encore dans nos collections.

33. *OREAS CANNA* VAR. *LIVINGSTONII* (Scl.), ♀. — Nom indigène : *Ncheffou*.
Nous ne possédions pas davantage cette race à flancs rayés.

34. *STREPSICEROS KUDU* (Gr.), ♂. — Nom indigène : *Ngoma*.

Cette espèce n'était représentée dans nos galeries que par des exemplaires ayant vécu en Ménagerie.

35. *TRAGELAPHUS SCRIPTUS ROUALEYNI* (G. Cum.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Mbaouala*.

36. *TRAGELAPHUS ANGASI* (Ang.), ♂ et ♀. — Nom indigène : *Boo-Inyala*.

Ce beau Guib de l'Afrique sud-orientale manquait encore à nos collections.

Toutes ces pièces, en bon état de conservation, permettront de combler bien des vides dans nos galeries et nous sont d'autant plus précieuses que

(1) De Winton. *Ann. Mag. nat. hist.* Ser. 6. Vol. XVII, p. 319, 1896.

(2) R. I. Pocock. *Ann. Mag. nat. hist.* Ser. 6. Vol. XX, p. 46, 1897.

nous n'avons que rarement l'occasion de recevoir des collections de la côte orientale d'Afrique, où nous ne possédons aucune colonie, à part nos stations d'Obock et de Djibouti, sur le littoral du golfe d'Aden.

*SUR LA VALIDITÉ GÉNÉRIQUE ET SPÉCIFIQUE
DU BDEOGALE NIGRIPES (PUCH.),*

PAR E. DE POUSARGUES.

Dans un précédent travail ⁽¹⁾, j'ai déjà eu l'occasion d'insister sur les caractères qui nécessitent la distinction du *Bdeogale nigripes* (Puch.) d'avec un autre Herpestidé, *Ichneumia albicauda* (G. Guv.), qui présente avec lui de grandes ressemblances sous le rapport de la coloration du pelage et que, pour cette raison, l'on avait cru devoir lui être assimilé. Faute de matériaux suffisants, il m'avait été impossible de fournir à ce sujet toutes les preuves désirables; grâce au zèle et aux recherches du R. P. Buléon, que je tiens à remercier ici, je peux aujourd'hui combler cette lacune d'après l'examen d'un magnifique spécimen femelle adulte de cette espèce contestée, tué dans le pays des Eschiras (Congo français). Cet exemplaire mesure 0 m. 67 pour la tête et le corps, 0 m. 39 pour la queue, et, en ce qui concerne le pelage et le mode de conformation des membres, répond en tous points aux observations faites par M. Barboza du Bocage sur deux spécimens d'Angola. « Ces deux individus femelles, écrit l'éminent naturaliste portugais, diffèrent de l'*H. albicauda* par leur système de coloration et par l'absence du premier doigt aux membres antérieurs et postérieurs. La fourrure, composée de poils plus courts, annelés de blanc et de noir, non entremêlés de longs poils noirs si abondants chez l'*H. albicauda*, présente une coloration uniforme tiquetée de blanc sur un fond noirâtre. Le noir des membres est moins étendu ⁽²⁾. » Les adultes présentent donc constamment un pelage plus court que les jeunes; quant à la tétradactylie constatée sur six spécimens, deux au Musée de Lisbonne et quatre au Muséum de Paris, elle est indéniable, et, de ce fait, ces animaux doivent être admis dans le genre *Bdeogale*. Cette conclusion se trouve confirmée par le mode de conformation du crâne et des dents, comme on peut s'en convaincre d'après les figures ci-contre.

La tête osseuse est herpestiforme, mais se distingue immédiatement de celle des Mangoustes et de l'Ichneumie, d'une part, par l'étroitesse et l'al-

(1) De Pousargues. *Mamm. Congo franç.* (Ann. Sc. nat. Zool. 8^e Sér. T. III. p. 306, 1896.)

(2) Barboza du Bocage. *Jorn. Sc. math. phys. natur. Lisboa.* 2^e série, n^o 3, p. 180, 1889.